PURCHASED

"L'Echange", Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC, Rédacteur

Opuscula martialis

II

(16 Avril 1941)

BRITISH MUSEUM (NAT. HIST.)
DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY

MOULINS

" LES IMPRIMERIES RÉUNIES "

15, RUE D'ENGHIEN, 15

Ce nouveau fascicule spécial contient, comme le précédent, des nouveautés diverses de Coléoptères paléarctiques ou exotiques dont les *types* se trouvent dans ma collection. Les familles, comme dans le n° 1, sont indiquées par les premières lettres de leur désignation, par exemple : *Cer.* pour *Cerambycide*, *Hét.* pour *Hétéromère*.

Leptura montana Muls. [Cer.]. A distinguer les var. nouv. de Syrie ou du Taurus. V. ♀ *Juliæ*, à thorax noir ; V. ♀ *Claudiusi*, à thorax noir, maculé de rouge, élytres noires, marquées de roux antérieurement ; V. ♂ *Mulsanti*, à élytres noires avec macule humérale jaune ; V. ♂ *Victoris*, à élytres concolores, jaunes.

Leptura moreana Pic. A distinguer les var. nouv. ♀, de Morée. *V. birubrosignata*, à élytres noires marquées de roux à la base et vers l'extrémité ; *v. atrovittata* à élytres rouges, mais étroitement noires sur le milieu des côtés et à bande noire vers la suture.

Leptura dubia v. n. birubronotata ♀. Elytris nigris, vitta rubra abbreviata ad humeros intus dilatata et macula rubra anteapicalis ornatis. Grande-Chartreuse (Pic).

Doktouroffia nebulosa v. n. vittata ♀ [Cer.]. Elytris testaceis, lateraliter late sinuate nigro vittatis, vitta ante medium intus dilatata. Asie Centrale.

Grammoptera elongata n. sp. [Cer.]. Angustatus, parum nitidus, niger, capite thoraceque subauratis, elytris viride cyaneis, membris nigris, femoribus ad basin rufis. Long. 8 mill. Chine.

Necydalis major L. [Cer.]. A distinguer les var. nouv. *v. subnotata*, à élytres un peu marquées de foncé au sommet, antennes noires à base testacée, pattes testacées avec les fémurs postérieurs noirs au sommet, des Hautes-

Alpes (Pic) ; *v. rufiventris*, à abdomen en majeure partie roux, un peu marqué de brun, d'Allemagne ; *v. altaica*, à élytres et membres roux, avec les fémurs postérieurs, vers l'extrémité et en dessus, marqués de brun, abdomen bicolore, tibias postérieurs subsinués, d'Altai.

Cerambyx apiceplicatus n. sp. ♀ [Cer.]. Sat robustus, postice valde attenuatus, niger, elytris apice paulo rufescentibus ; antennis corpore paulo longioribus, articulis 3-5 elongatis, apice paulo nodulosis ; thorace antice et postice transverse plicato et sulcato, in disco irregulariter et diverse plicato et impresso ; elytris ad basin latis, postice longe et valde attenuatis, ante apicem transverse plicatis, ad suturam apice minute angulatis, breve pubescentibus, minute sculpturatis et punctatis. Long. 45 mill. Mossoul. — Caractérisé par les élytres munis d'un pli antéapical.

Purpuricenus Kœhleri v. n. Ferrarioi [Cer.]. Elytris rufis, reducte nigro bivittatis, vittis ad suturam postice junctis. Italie.

P. budensis subs. n. longevittatus. Minutus, subparallelus, thorace supra biimpresso, postice medio gibbuloso et paulo nitido, illo nigro, transverse rufo fasciato ; elytris parallelis, nigris, lateraliter late et longe rufo vittatis. Long. 9 mil. Liban. — Caractérisé par la structure du thorax et le dessin particulier des élytres.

Dorcadion Bolivari Lauf. A distinguer les var. nouv. d'Espagne. *V. sparsealbum*, ♂, ♀, à élytres ayant sur le disque de nombreuses macules blanches éparses ; *v. diversevittatum* ♀, à élytres ayant, sur le disque, des bandes longitudinales foncées ou blanches.

D. robustioripenne n. sp. Robustus, oblongo-ovatus, niger, griseo pubescens, elytris in disco reducte fulvo-interrupte lineatis, antennis pro parte griseo annulatis ; ca-

pite medio antice fortiter, postice minute, sulcato, diverse et sparse punctato ; thorace breve et lato, supra paulo inæquale, lateraliter dentato, parum fortiter et disperse punctato ; elytris sat latis et brevibus, ad medium subarcuatis, postice attenuatis et subrotundatis, minute et sparse punctatis, antice externe granulatis L. 13 mill. Grenade, — Plus court que *parmeniforme* Esc. avec un autre revêtement.

D. curtecostatum n. sp. Oblongo-elongatus, niger, fulvo pubescens, elytris albo cinctis et in disco reducte albo vittatis, intus uni lineato maculatis ; capite medio sulcato, minute et disperse punctato ; thorace breve et lato, medio minute sulcato, lateraliter obtuse dentato, supra paulo inæquale, minute, in disco sparse punctato ; elytris parum elongatis, lateraliter subarcuatis, apice separate rotundatis et distincte marginatis, ad humeros reducte carinatis, minutissime et sparse punctatis. Long. 17 mill. Lerida. — Caractérisé par sa courte carène humérale et son dessin élytral formé de bandes et d'une ligne de macules.

D. mucidum v. n. nigrosparsum. Elytris griseo obscuris, multi et diverse nigro-velutino maculatis. Malaga.

D. Uhagoni Per. A distinguer les var. nouv. d'Espagne *v. multidisjunctum,* à élytres ayant, en dessous des épaules, une bande foncée en partie décomposée en macules ; *v. cuencaense,* à élytres à revêtement blanc ou jaunâtre, ornés de 2 bandes longitudinales et d'une macule basale foncées.

D. tenuecinctum v. n. rufobasicorne. Pubescence du dessus plus ou moins fauve, base des antennes et pattes rouges. Espagne.

Anthicus Magnini subs. basithorax [Het.]. Elongatus, griseo pubescens, nigro-piceus, thorace lateraliter et pos-

tice rufo, articulis 2 et sequentibus antennarum pedibusque testaceis, femoribus pro parte brunneis. Long. 3 mill. Crête. — Distinct, à première vue, par le thorax non entièrement foncé.

Zonitis lateapicalis n. sp. [Hét.]. Parum elongatus, postice paùlo latior, nitidus, ruber, elytris apice late nigris, capite antice, membris et abdomine pro parte nigris. Long. 15 mill. Indes Mér.

Z. rufobasalis n. sp. Elongatus, nitidus, rufo-testaceus, capite postice late elytrisque nigris, his ad basin intus rufo-testaceo notatis et antice externe rufo limbatis, his nigro hirsutis. Long. 12 mill. Indes Mér. — A placer près de *Gorhami* Pic.

Z. ceylonica n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, rufo-testaceus, elytris apice sat breve nigris, capite antice, antennis, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris. Long. 13 mill. Ceylan. — Voisin de *sikkimensis* Pic.

Z. curticeps n. sp. Parum elongatus, nitidus, elytris subopacis, testaceus, elytris apice breve nigro notatis, palpis apice, tibiis pro parte tarsisque diverse nigris. Long. 14 mill. Java. — Voisin de *javana* Pic.

Z. Vittmeri n. sp. Elongatus ,subparallelus, parum nitidus, rufo-testaceus, palpis, antennis (articulis primis diverse rufis), tibiis pro parte tarsisque nigris. Long. 14 mill. Java. — Voisin de *batjanensis* Pic.

Z. subopaca n. sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, elytris opacis, luteus, palpis, antennis, articulo 1° excepto testaceo, tibiis, his ad basin breve testaceis, tarsisque nigris. Long. 8 mill. Ile Saleier. — Voisin du précédent.

Z. atrimembris n. sp. Minutus, subparallelus, nitidus, niger, thorace elytrisque testaceis, his apice nigris, abdomine circa testaceo. Long. 7 mill. Haïphong.

Nemognatha angustata n. sp. [Hét.]. Angustatus, parum nitidus, rufo-testaceus, elytris apice breve nigris, membris nigris, articulo 1° antennarum femoribusque ad basin late rufis. Long. 10-11 mill. Indes Mér. — Voisin de *Rouyeri* Pic.

Zonabris subarcuatefasciata n. sp. [Hét.]. Angustatus, nitidus, fusco pilosus, minute punctatus, nigro metallicus, elytris ad basin, in singulo, luteo bimaculatis, ad medium oblique sinuate et post medium arcuate, sinuate luteo fasciatis. Long. 9 mill. Namaqualand. — Voisin de *Alicæ* Pic, fascies différentes.

Z. discotrisignata n. sp. Elongatus, sat dense griseo-argenteo pubescens et fusco pilosus, minute, pro parte dense punctatus, niger, elytris flavis, ad suturam anguste nigris, in disco signaturis nigris ornatis ; linea humeralis reducta, macula bidentata postmediana, macula transversa subapicalis. Long. 18 mill. Congo. — A placer près de *luteoapicalis* Pic.

Z. testaceipennis mihi, du Congo, voisin du précédent, est un peu plus large et très caractérisé par les élytres concolores claires.

Z. Le Testui n. sp. Angustatus, parum nitidus, breve griseo aut fusco pilosus, niger, elytris aurantiacis, ad basin et post scutellum nigro marginatis, transverse nigro sinuate trifasciatis, fascia prima interrupta ; antennis sat elongatis, rufis, ad basin nigris. Long. 20 mill. Oubangui.

Zonabris opacipennis n. sp. Elongatus, parum nitidus, griseo aut nigro pilosus, niger, elytris in singulo sex (2, 2, 2) luteo maculatis, maculis internis subrotundatis ; antennis rufis, ad basin nigris. Long. 14 mill. Natal. — A placer près de *pruinosa* Gerst.

Z. particularefasciata n. sp. Robustus, dense argenteo pubescens et nigro hirsutus, opacus, niger, elytris, in sin-

gulo, luteo fasciatis et maculatis : fascia basalis particularis intus arcuata, externe circa humeros, fascia mediana sinuata et paulo obliqua, maculis duabus posticis, oblique dispositis. Long. 13 mill. Tanganika. — Voisin de *sibutensis* Pic.

Z. externenotata n. sp. Elongatus, parum nitidus, albo pubescens et pilosus, niger, elytris rufis, apice nigris, ad scutellum, ad humeros et post medium externe nigro signatis, antennis nigris. Long. 13 mill. Guinée. — A placer près de *Le Moulti* Pic.

Z. diversipes n. sp. Elongatus, subopacus, griseo pubescens et nigro hirsutus, niger, antennis pedibusque 4 anticis pro parte rufis, elytris, in singulo, luteo signatis : macula prescutellaris et vitta externa basalis, duabus fasciis sinuatis, secunda externe interrupta. Long. 16 mill. Katanga. — Voisin de *Severini* Pic.

Z. vestita Reiche. A distinguer les var. suivantes du Dahomey. Sur chaque élytre, deux macules sont jointes, formant fascie, soit les médianes (*v. mediojuncta*), soit les postérieures (*v. subjuncta*), soit les 2 internes antérieures (*v. internejuncta*).

Z. sibutensis subs. yalanganus. Sat elongatus, argenteo pubescens, niger, elytris rufis, apice nigris, ad suturam sinuate nigro vittatis, ad humeros et ad medium externe nigro maculatis, post medium reducte nigro et sinuate fasciatis. Oubangui.

Z. sibutensis Pic. A distinguer les var. suivantes du Dahomey. Sur chaque élytre, la fascie basale est divisée soit vers l'écusson (*v. anticedivisa*), soit sur les côtés (*v. externedivisa*), tandis que les autres fascies sont complètes ; avec la première fascie, la 2e aussi divisée (*v. bidivisa*) ou toutes les fascies divisées (*v. tridivisa*). La pre-

mière et la 2e fascie sont complètes, la 3e est divisée (*v. postdivisa*).

Decatoma Alluaudi n. sp. [Hét.]. Oblongo-elongatus, subopacus, griseo pubescens, niger, elytris, in singulo, signaturis rufis ornatis : maculis duabus basalibus elongatis et fere rectis, fascia mediana et fascia postmediana sinuatis ; antennis sat brevibus, nigris. Long. 15 mill. Soudan. — A placer près de *affinis* Bilb.

D. Overlatei mihi, du Congo, est analogue à *semifenestrata* Pic avec la différence que les élytres ont une fascie sinuée jaune postérieure, au lieu de deux macules.

D. sanghana mihi, du Congo, voisin de *affinis* Bilb. ; en partie pubescent de gris, est noir, les élytres ont chacun une courte bande discale antérieure jaune, une étroite bordure latérale antérieure et 2 macules postmédianes également jaunes, l'interne transversale discale, l'externe petite, sur le bord marginal.

Actenodia 4-notata n. sp. [Hét.]. Elongatus, griseo pubescens, niger, membris rufis, tibiis pro parte brunneis, elytris lateraliter testaceo undulato marginatis, apice testaceo limbatis, in disco longitudinaliter 4-luteo maculatis. Long. 6 mill. Soudan. Voisin de *Peringueyi* Pic (*jucunda* Per. nec Er.), mais antennes rousses et non foncées.

A. 6-punctata n. sp. Robustus, parum nitidus, nigro pilosus, niger, elytris aurantiacis, apice nigris, in singulo post basin transverse nigro trimaculatis, ad medium nigro sinuate fasciatis. Long. 10 mill. Transvaal. — Voisin de *bonnefoiana* Pic.

A. curtula Fahr. A distinguer les var. nouv. de l'Afr. Austr. : *rufobasalis*, bande antérieure noire des élytres isolée de la base, sauf dans le pourtour de l'écusson ; *v. biinterrupta*, la fascie médiane noire est divisée, sur chaque élytre, en deux parties.

A. chrysomelina v. n. juncta. Fasciis nigris elytrorum in disco junctis. Afr. Australe.

Ceroctis postrimaculata n. sp. [Hét.]. Elongatus, subopacus, griseo pubescens et pro parte fusco hirsutus, niger, elytris antice aurantiacis, post humeros transverse, ad suturam reducte nigro fasciatis et in disco nigro maculatis, postice nigris aurantiaco tri (2, 1) maculatis ; antennis sat brevibus. Long. 8 mill. Congo. — Voisin de *manowa* Pic, ponctuation du thorax plus dense avec un long sillon étroit, forme plus étroite.

C. lateapicalis n. sp. Sat robustus, griseo pubescens, dense punctatus, niger, antice vage æneus, elytris aurantiacis, apice late nigris, ante medium oblique nigro bimaculatis, ad medium externe nigro maculatis. Long. 20 mill. Congo. — Voisin de *serricornis* Gerst., dessins des élytres différents.

C. tangana n. sp. Elongatus, subopacus, argenteo aut luteo pubescens, niger, elytris antice lateraliter luteo vittatis, in disco ad basin longe, ante medium et ante apicem transverse luteo maculatis, post medium luteo sinuate fasciatis, fascia ad suturam obliterata ; antennis parum elongatis. Long. 15-17 mill. Tanga. — A placer près de *villerosa* Th.

C. nitida n. sp. Elongatus, nitidus, paulo griseo pubescens, niger, elytris antice externe luteo vittatis, ad basin luteo maculatis, ad et post medium anguste luteo fasciatis, ante apicem reducte luteo fasciatis. Long. 7 mill. Congo. — Peut se placer près de *congoana* Duv.

C. trifasciata n. sp. Elongatus, parum nitidus, mediocre pubescens, niger, elytris luteis, nigro sinuate trifasciatis, margine apicale pro parte obscuro ; antennis sat elongatis, apice parum dentatis. Long. 11-13 mill. Windhock. — Voisin de *4-fasciata* Th.

C. diversesignata n. sp. Elongatus, parum nitidus, obscure pubescens, niger, elytris ad basin sat late luteis, ante medium luteo bimaculatis, macula externa antice remota, post medium luteo sinuate fasciatis, ante apicem transverse luteo maculatis ; antennis elongatis, valde dentatis. Long. 7 mill. Afr. Or. — Voisin du précédent.

C. curtipennis n. sp. Oblongus, subopacus, parum griseo pubescens, niger, elytris ad basin intus reducte luteo fasciatis et infra humeros luteo maculatis, ad medium luteo sinuate undulatis, post medium transverse luteo binotatis ; antennis brevibus ; thorace robusto. Long. 12 mill. Afrique Australe.

Dasyteneclines n. gen. [Cler.]. Corpus parum robustus ; antennis sat brevibus, articulis ultimis valde dilatatis ; articulis ultimis palparum diverse cylindricis. Genre pouvant se placer près de *Epiclines* Ch., établi pour l'espèce suivante.

D. dasytoides n. sp. Oblongus, pubescens, parum nitidus, rufo-luteus, capite postice viride notato, abdomine elytrisque viridi metallicis, his lateraliter pro parte et apice testaceo marginatis, in singulo antice oblique luteo fasciatis, post medium in disco transverse maculatis, membris rufis, antennis sat brevibus, apice valde dilatatis. Long. 4,5 mill. R. Argentine.

Dereutes brevenotata n. sp. [Cler.]. Parum elongatus, metallicus, parum pubescens, nigro-æneus, elytris viridibus, in disco breve albo notatis, membris pro majore parte rufis. Long. 6 mill. Chili. — Peut se placer près de *viridis* Phil.

D. Germaini n. sp. Elongatus, parum pubescens, nigro-æneus, elytris viride-olivaceis, paulo granulosis, pedibus pro parte et diverse rufis, pro parte nigris. Long. 4 mill. Chili. — Voisin du précédent.

D. brevevittata n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, capite thoraceque viridibus, elytris æneo-olivaceis, in disco antice luteo vittatis (*forma typica*), aliquot, infra vittam, externe oblique luteo fasciatis (*v. bisignata*), membris pro majore parte testaceis. Long. 6 mill. Chili. — Voisin de *vittula* F. G.

D. multisignata n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, olivaceus, thorace antice et postice rufo marginato, elytris apice rufo notatis, antice in disco luteo vittatis, ad medium albo punctatis et reducte albo fasciatis, membris pro parte rufis. Long. 6 mill. Chili. — Voisin du précédent.

D. latefasciata n. sp. Elongatus, pubescens, nitidus, nigro-viridescens, elytris subæneis ad medium late albo fasciatis et apice late albis. Long. 4,5 mill. Chili. — A placer près de *modestus* Phil.

Placopterus obscuripes n. sp. [Cler.]. Viridis aut viride-cyaneus, pedibus nigro-æneis, albo pubescens ; thorace minute et sparse punctato, medio paulo dilatato ; elytris thorace sat latioribus, irregulariter punctatis et paulo plicatis. Long. 5 mill. Mexique. — Caractérisé par la coloration générale foncée.

Derestenus latefasciatus n. sp. [Cler.]. Elongatus, nitidus, niger, capite thoraceque luteis, nigro notatis, elytris luteis, ad basin et ante apicem late nigro-subviolaceis, pro parte diverse lineato punctatis, membris nigris, femoribus pro majore parte flavis. Long. 6 mill. Bolivie. — Caractérisé par la large fascie claire des élytres.

D. apicalis n. sp. Elongatus, niger, elytris vage cyaneis, apice breve flavo maculatis, capite thorace femoribusque ad basin rufo-testaceis. Long. 5 mill. Guatemala. — Près *colombicus* Sp., caractérisé par les élytres à macule apicale claire.

D. testaceicornis n. sp. Elongatus, niger, infra corpore pro parte femoribusque apice nigris, elytris violaceis, lateraliter et apice albis, thorace postice interrupte nigro fasciato. Long. 5 mill. Panama. — A placer près de *limbatus* Gorh.

D. limbatus v. nov. notaticollis. Thorace flavo, antice breve nigro notato, elytris toto anguste testaceo marginatis. Vénézuéla.

D. limbatus v. nov. suturalis. Thorace nigro, antice flavo notato, elytris nigro-violaceis, ad suturam et lateraliter testaceo marginatis. Vénézuéla.

D. limbatus v. nov. latesuturalis. Thorace nigro, antice flavo notato, elytris testaceis, in disco late nigro-violaceo vittatis. Bolivie.

Zenithicola cribricollis n. sp. [Cler.]. Oblongus, nigro-metallicus, elytris paulo cyaneis, postice albo signatis ; thorace subglobuloso, fortiter sed diverse foveolato-punctato, non impresso. Long. 10 mill. Australie. — Voisin de funestus Chevr., avec le thorax d'une autre structure.

Z. australis v. nov. rufipes. Elytris viridibus, membris rufis. Australie. Diffère de la forme typique par les élytres non bronzés et les pattes rousses.

La **var. major,** de 12 mill., est bronzée, avec les pattes en majeure partie rousses.

Phlogistus violaceonotatus n. sp. [Cler.]. Minutus, parum elongatus, fusco hirsutus, nitidus, viridescens, elytris apice violaceo purpureis, antennis rufis ; thorace sat fortiter punctato, medio impresso-sulcato. Long. 4 mill. Australie. — A placer près de *parvulus* Bl.

P. Grandjeani mihi, un peu plus allongé que le précédent, a le dessus du corps uniformément vert et une impression thoracique non sillonnée.

P. rufimembris n. sp. Parum elongatus, fusco hirsutus, nitidus, cyaneus, membris rufis, tibiis carinatis ; thorace inimpresso, parum fortiter sat sparse punctato ; elytris fortiter et transverse punctato lineatis, apice fortiter et irregulariter punctatis. Long. 7 mill. Australie. — Diffère de *elongatus* H., au moins par la coloration.

P. Corporaali mihi, voisin du précédent par sa sculpture et ses tibias carénés, est plus ou moins verdâtre, avec le dessus du corps cuivreux, parfois un peu doré, les pattes sont foncées.

P. bicoloriceps n. sp. Sat robustus, albo aut fusco pubescens, infra nigro-cupreus, supra viridis, capite antice, antennis pedibusque rufis, tibiis carinatis. Long. 8 mill. Australie. — Espèce très caractérisée par la tête bicolore et la ponctuation presque arrondie des stries.

P. diversitarsis mihi, a la coloration analogue du précédent avec la partie postérieure de la tête et le thorax à reflets un peu dorés, mais le thorax est plus large, faiblement impressionné, la ponctuation des élytres est transversale, les tarses postérieurs sont noirs.

P. limbatus n. sp. Elongatus, nitidus, albo et fusco pubescens, viridis, elytris lateraliter cupreis, antennis rufis ; thorace parum et diverse punctato, medio minute sulcato, elytris post basin ultra medium fortiter lineato punctatis et plicatis, apice irregulariter punctatis. Long. 7 mill. Australie. — Voisin de *imperialis* Gorh.

Notostenus perforatus n. sp. [Cler.]. Angustatus, nitidus, subconvexus, nigro hirsutus, viride metallicus, antennis rufis, clava picea ; thorace medio profunde et sparse punctato ; elytris pro parte fortiter et irregulariter punctatis. Long. 6 mill. Transvaal. — Caractérisé par la profonde ponctuation du thorax.

Opetiopalpus basicornis n. sp. Oblongus, subopacus, griseo pubescens et nigro hirsutus, niger, antennis ad basin, thorace pedibusque rufis ; elytris sat fortiter, pro parte regulariter lineato-punctatis. Long. 2,5-3 mill. Tonkin. — Voisin de *obesus* W.

Scelodonta Jeanvoinei n. sp. [Phy.]. Oblongus, nitidus, æneo-cupreus ; capite alutaceo, punctato, medio læve lineato, inter oculos impresso ; elytris sinuatis, apice attenuatis, minute lineato punctatis. Long. 4 mill. Tonkin. — Voisin de *Blaisei* Pic, avec l'aspect plus brillant, la sculpture plus fine des élytres.

S. diversecostata n. sp. Oblongus, robustus, parum nitidus, viride-cupreus, elytris minute violaceo notatis ; capite in vertice longe sulcato ; thorace multiplicato ; elytris costatis, diverse punctatis, pro parte transverse plicatis. Long. 9 mill. Bornéo. — Caractérisé par la sculpture élytrale particulière.

Malegia lata [Phy.]. Oblongus, latus, parum dense griseo pilosus, nitidus, olivaceo subauratus, membris testaceis, antennis apice pro parte nigris ; thorace parum breve, lateraliter subarcuato ; elytris latis et brevibus, postice attenuatis. Long. 3 mill. Indes Mér. — Diffère de *indica* Pic par sa forme robuste.

M. olivacea mihi, de Chine, voisin du précédent, est un peu plus petit et moins robuste, la coloration foncière est simplement olivâtre, la pubescence plus fine.

M. Vadoni n. sp. Oblongus, parum latus, subnitidus, parum dense griseo pilosus, nigro plumbeus, membris testaceis. Long. 3 mill. Madagascar. — Voisin de *latipennis* Pic, en diffère par le thorax ayant sa plus grande largeur vers le milieu, et non en dessous, avec les élytres moins courts.

Lema Nathani n. sp. [Phy.]. Elongatus, nitidus, rufus, elytris cyaneis, membris et abdomine nigris ; thorace parum elongato, ad basin paulo strangulato et transverse sulcato, diverse punctato ; elytris sat elongatis, subparallelis, minute striatis et diverse, postice minute, punctatis. Long. 5 mill. Indes Mér. — Voisin de *basicollis* Pic.

Cryptocephalus atroapicalis n. sp. [Phy.]. Parum elongatus, subparallelus, rufus, elytris dimidio postice nigris ; thorace indistincte punctato ; elytris pro parte substriatis, minute lineato punctatis ; infra corpore paulo pubescente. Long. 8 mill. Indes. — A placer près de *6-signatus* F.

C. jurandanus n. sp. Oblongus, sat latus, postice paulo attenuatus, rufus, elytris ad medium late nigro fasciatis ; thorace indistincte punctato ; elytris pro parte substriatis, minute lineato-punctatis. Long. 8 mill. Indes. — Voisin du précédent.

C. Nathani n. sp. Oblongus, postice attenuatus, niger, thorace lateraliter vage rufo, post medium nigro fasciatis, antennis tibiisque pro parte rufis ; elytris diverse striato-punctatis. Long. 4 mill. Indes Mér. — Voisin du précédent.

C. trinotaticeps n. sp. Oblongus, postice attenuatus, luteus, elytris rufis, circa et apice pro parte pallidioribus, capite brunneo trinotato ; thorace minute punctato, medio vage brunneo notato ; elytris lineato punctatis, externe diverse striatis. Long. 3,5 mill. Indes Mér. — A placer près de *fatuus* Suf.

C. flavoscutus n. sp. Oblongus, flavo-rufus aut flavus, antennis apice et abdomine pro parte nigris, elytris ad humeros nigro maculatis ; thorace indistincte punctato ; elytris minute lineato-punctatis. Long. 5 mill. Indes Mér. — A placer près de *analis* Ol.

C. notatopygus mihi, des Indes, voisin du précédent, est nettement atténué en arrière avec 2 macules noires au thorax, le pygidium est maculé de noir au milieu, les élytres ont chacun soit une macule humérale noire (*forme type*), soit 3 (2, 1) macules, la 3e placée sur le disque après le milieu (*v. Fouqueti*).

C. nigroscutus n. sp. Oblongus, postice attenuatus, testaceus, scutello nigro, thorace nigro bimaculato, humeris nigro maculatis ; thorace indistincte punctato ; elytris pro parte substriatis, lineato punctatis. Long. 4 mill. Indes. — A placer près de *divisus* Jac.

Miochira unifasciata n. sp. [Phy.]. Angustatus, nitidus, indistincte punctatus, rufo-testaceus, elytris ad humeros late nigro-subcyaneo maculatis et ante apicem nigro-subcyaneo sinuate fasciatis, pygidio diverse nigro. Long. 8 mill. Indes. A placer près de *indica* Jac. La *var. inhumeralis*, de Malacca, n'a pas de macule foncée humérale.

Cyaniris diversiceps n. sp. [Phy.]. Oblongo-elongatus, nitidus, rufo-testaceus, elytris ad humeros brunneo maculatis, capite postice late, antennis apice, femoribus pro parte et infra corpore nigris. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin de *bicoloripes* Pic, mais tête bicolore, tibias entièrement clairs.

C. piceifrons n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, capite postice piceo, scutello et infra corpore nigris, elytris ad humeros vage brunneo maculatis et lateraliter brunneo lineatis. Long. 4,5 mill. Indes. — Voisin de *divisa* Jac.

C. brevelinea mihi, des Indes, voisin du précédent, en diffère par l'écusson en partie testacé, les épaules non marquées de brun, la poitrine en partie et le pygidium foncés.

C. atropyga n. sp. Oblongus, nitidus, rufo-testaceus, pectore pro parte pygidioque nigris, elytris ad medium externe reducte nigro vittatis. Long. 4 mill. Indes Mér.

Idgia costulata n. sp. [Mal.]. Parum elongatus, griseo pubescens, nitidus, testaceus, capite pedibusque (femoribus ad basin rufis) nigris, elytris olivaceo-viridibus, subcostulatis, lineato granulosis et nigro hirsutis. Long. 11 mill. Haïnan. — Voisin de *flavithorax* Pic.

I. cœruleipes mihi, de Pahang, voisin du précédent par la sculpture des élytres, est plus allongé et plus petit, la tête est bleue, ainsi que le dessous et les pattes, les élytres d'un vert olivâtre, le thorax roux, les antennes sont foncées avec le 3^{e} article roussâtre.

I. rufobasalis n. sp. Elongatus, nitidus, rufo-testaceus, capite postice late elytrisque nigris, his ad basin intus rufo-testaceo notatis et antice externe rufo limbatis, his nigro hirsutis. Long. 12 mill. Indes Mér. — Voisin de *Gorhami* Pic.

Photinus laticollis n. sp. [Lam.]. Oblongus, sat latus, piceus, membris pro parte testaceis ; thorace sat breve et lato, flavo, medio piceo notato, elytris toto, externe latiore, flavo marginatis ; abdomine piceo, segmentibus tribus ultimis luteis. Long. 18 mill. Brésil. — A placer près de *brevenotatus* Pic. La *var. latior* a une forme plus trapue et la partie noire du disque du thorax est bilinéolé de rouge.

P. Augustalisi n. sp. Oblongo-elongatus, niger, thorace anguste flavo marginato, elytris externe reducte et late flavo vittatis, vitta antice attenuata, segmentibus 4°, 5° abdominis luteo maculatis. Long. 11 mill. Brésil. — A placer près de *lateralis* Mots.

M. Pic.

Moulins, Les Imprimeries Réunies.